

四庫全書

子部

欽定四庫全書

仁齋直指卷十二

宋 楊士瀛 撰

明 朱崇正 附遺

瀉痢

瀉痢方論

痢與瀉名目不同而感受之源一也風邪得之鼻壅惡
風腰背強痛寒邪得之面慘惡寒肢體拘攣受暑得之
面垢背寒自汗發渴受溫得之一身盡痛重着浮黃或

青黃身體拘急寒慄鼓頷腰脊俱疼寒去未幾內外皆
熱頭痛而渴但欲飲冷嘔惡妨滿而不嗜食者其候也
或內伏寒痰寒從背起冷如掌大瘡之寒熱其豈非陰
陽二氣更相勝負而作耶邪併於陰則寒邪併於陽則
熱陰盛則寒多陽盛則熱熾其寒也湯火不能溫其熱
也冰水不能寒衛氣與邪氣相值故邪正交爭而病以
作衛氣與邪氣相離故汗出乃解而病以休衛氣晝行
陽夜行陰得陽而外出故發於日間得陰而內搏故發

於暮夜若乃邪氣內搏於五臟橫連於募原其道遠其
行遲不能與衛氣交併故有隔日發有三四日一發衛
氣之行疾行遲病作之有蚤有晏甚者內外失守真邪
不分陰陽迭勝寒熱互起則休作無定時矣瘡有數種
○風瘡自感風而得惡風自汗煩燥頭疼轉而為瘡風
陽氣也故先熱後寒可與解散風邪如川芎白芷青皮
紫蘇之類或細辛檳榔佐之溫瘡一證亦先熱後寒此
為傷寒壞病與風瘡大畧則同熱多寒少小柴胡湯熱

少寒多小柴胡湯內加官桂○寒瘧自感寒而得無汗惡寒攣痛面慘轉而為瘧寒陰氣也故先寒後熱可與發散寒邪生料五積散增桂養胃湯或良薑乾薑官桂草果之類甚則薑附湯附子理中湯○暑瘧者暑勝熱多得之一名瘧瘧陰氣獨微陽氣獨發但熱不寒裏實不泄煩渴且嘔肌肉消鑠蓋用小柴胡湯香薷散嘔者縮脾飲加生薑溫服下消暑圓熱多燥甚者少與竹葉湯常山柴胡於暑證最便○濕瘧者冒襲雨濕汗出溼

浴得之身體痛重肢節煩疼嘔逆脹滿蓋用五苓散除
濕湯加蒼朮茯苓輩寒多者朮附湯最良○牝瘡者久
受陰濕陰盛陽虛陽不能制陰所以寒多不熱氣虛而
泄悽慘振振柴胡桂薑湯減半黃芩加以半夏施之為
當○食瘡一名胃瘡飲食無節飢飽有傷致然也凡食
啖生冷鹹藏魚鹽肥膩中脘生痰皆為食瘡其狀苦飢
而不能食食則中滿嘔逆腹痛青皮陳皮草果半夏縮
砂白豆蔻作劑或四獸湯下紅圓子自有奇功○瘡瘡

挾嵐瘴溪源蒸毒之氣致然也自嶺以南地毒苦炎燥濕不常人多瘡瘡其狀血乘上焦病欲來時令人迷困甚則發燥狂忘亦有啞不能言者皆由敗血瘀於心毒涎聚於脾坡仙指為脾胃實熱所致又有甚於傷暑之瘡耳治之須用涼膈疏通大腸小柴胡加大黃治瘡木香圓觀音圓皆為要藥○如前數證經久不瘥真氣已耗邪氣猶存則有所謂勞瘡瘡母者焉表裏俱虛真元未復疾雖暫止小勞復來謂之勞瘡法當調養氣血川

芎當歸官桂芍藥輩所不可無○彌年閱歲經吐汗下
榮衛虧損邪氣伏藏脇間結為癥癖謂之瘕母此證未
可直攻急作烏頭七棗湯以扶其裏俟其內氣已充繼
此經效瘕丹或消癖圓下之取愈大抵瘕之初得三數
日間如火燎原不可嚮邇波濤洶湧未易回瀾當俟其
稍定而圖之經所謂其盛者可待衰而已瘕方來與正
發及將解不可投藥耗其真氣投藥當於未發以前兩
時之先或遇發日凌晨空心與之諸瘕之脉大約尺寸

俱弦或浮數或緊實或緩濇或虛遲或左手濡而右手盛或尺寸盛而關中濡不可定名以為弦也總前治法弦數多熱者寒之弦遲多寒者溫之浮弦浮緊浮數其邪在表者可汗弦實沉實數實其邪在裏者可下若夫調胃氣利痰水分陰陽行三焦是又治法之綱領也渴欲水漿藥入輒吐人參煎湯效抑猶有說焉嘗讀二廣攝生見其論議若瘴瘡若暑毒每用踈轉之劑取下根源里有先傷暑後發瘡涉年餘者度其腹中有癖水磨

沉香下解毒雄黃圓黑血如泥泄下極臭由是獲愈因
知諸瘡皆有根在治法之外又當隨輕重而利導之實者
與巴豆大黃虛者用養正丹輩不然常山於瘡每每作
效何耶蓋瘡家多蓄黃水常山為能破其癖而下其水也

瘡瘡證治

麻黃白朮湯治感風發瘡

麻黃

去節

官桂

青皮

陳皮

川芎

白芷

半夏麴

紫蘇

茯苓

白朮

北梗

甘草

炙等分

加細辛

檳榔

右剉散每服參錢薑肆片棗貳枚空心煎服

五積散感寒發瘡初作以此解散

蒼朮

炒或兩

北梗

壹兩

麻黃

去節

枳殼

製

陳皮

各陸錢

乾薑

厚朴

各肆錢

川芎

當歸

白芍藥

白芷

甘草

炒

半夏

製

官桂

伏苓

錢各叁

右剉散每服叁錢水盞半蔥白叁寸薑叁片煎半空

心服

養胃湯加桂治感寒發瘧

厚朴

製

蒼朮

炒

半夏

製各壹兩

人參

茯苓

草果

藿香

各半兩

橘紅

叁分

甘草

炙壹分

右劉散每服參錢水盞半薑伍片烏梅半箇煎半溫服

解毒雄黃圓

方見積熱門

養正丹主寒瘡

方見癰冷門

薑附湯附子理中湯主寒瘡

方見

寒類

草果飲諸瘡通用加乾薑治寒瘡

草果

白芷

良薑

青皮

川芎

紫蘇葉

甘草

炒等分

右劉散每參錢煎服

小柴胡湯治暑瘧純熱

方見血類

或寒熱等則加桂

香薷散治傷暑發瘧

香薷

肆兩

厚朴

製

扁豆

製各貳兩

右劉散每參錢烏梅壹箇水煎臨熟入薑汁壹匙溫服

五物香薷湯香薷縮脾飲並主暑證

方見暑類

常山飲治傷暑發瘡

嫩黃川常山 知母

草果仁

甘草

炙各壹兩

良薑

陸錢

烏梅肉

半兩

右咬咀每參錢水壹碗薑伍片棗叁枚煎半稍冷服
七寶劉散治暑瘡諸瘡

川常山

雞心檳榔

青皮

刮去白

甘草

炙各半兩

草果仁

貳錢半

右細剉每參錢桃柳枝各柒寸烏梅叁箇水大碗煎

半稍冷空心服

五苓散治傷濕發瘡及小便不利

方見水飲類

加劑除濕湯术附湯並主濕瘡或加官桂伏苓

方見濕類

柴胡桂薑湯治牝瘡但寒或寒多微熱

柴胡

貳兩

辣桂

叁分

枯薑根

壹兩

乾薑

炮

甘草

炙

牡蠣

煨各半兩

黃芩

叁錢叁字

內加半夏麴

半兩

右剉散每服叁錢薑棗煎服

二陳湯治食瘕諸瘕

陳皮

半夏

製各伍兩

茯苓

叁兩

甘草

炙壹兩

右㕮咀每服叁錢薑伍片烏梅半箇煎服寒多者加草果熱多者加前胡如青皮檳榔縮砂白豆蔻之類隨意增用

四獸湯治食瘕諸瘕和胃消痰

半夏

製

人參

茯苓

白朮

橘紅

草果

生薑

烏梅

大棗
各等分

甘草

炙減半

右咬咀以鹽少許淹食頃濕紙厚裹慢火煨香熟每服肆錢水壹碗煎半溫服

紅圓子治食瘡食積氣滯腹脹

京三稜

水浸軟
截碎

蓬義木

煨

青皮

陳皮

各伍兩

胡椒

乾薑

炮各
叁兩

右為末米醋煮米粉糊圓桐子大礬紅為衣每伍拾圓二陳湯四獸湯皆可下

烏頭七棗湯治久瘡但久瘡但寒及脾寒發瘡或寒重熱輕

大川烏頭

壹箇燉火灰炮裂以鹽水浸再炮再浸凡七次去皮臍

右細剉分貳服每服薑柒厚片棗柒箇蔥白三寸水大碗煎半先喫棗稍冷服

又方用小附子壹枚修製一同烏附皆能溫脾挾風則

用川烏寒甚則用附子

治瘴木香圓

牽牛

壹斤淘去浮者焙搗
搗取末肆兩別頓

雞心檳榔

陳橘紅

各貳
兩

青木香

人參

熟附子

厚朴

製

官桂

去
皮
麋

京三棱

羌活

獨活

乾薑

炮

甘草

炙

川芎

川大黃

剉
焙

芍藥

各半
兩

肉豆蔻

陸
筒

右為末磁器密收臨用枰牽牛末一兩諸藥末共壹兩
研和煉蜜圓桐子大每服貳拾圓橘皮煎湯下以通
利為度

地龍飲治瘴癘諸瘡大熱煩燥

生地龍

叁條研
極細

右入生薑汁薄荷汁生蜜各少許新汲水調下如熱
熾加腦子少許

觀音圓取下暑毒瘴毒

圓白半夏

生

烏梅肉

母丁香

川巴豆

不去油每
件各拾枚

右為末薑麴糊圓麻子大上下以厚紙蓋貼有油又
再易紙每服伍圓臨卧冷水下此方舟人於海角遇
一白衣授之

芎歸鱉甲散治勞瘡寒熱

當歸

川芎

芍藥

青皮

陳皮

茯苓

半夏

製各
壹分

鱉甲

醋炙黃
半兩

右剉散每參錢薑伍片棗貳箇小烏梅壹箇水煎服
熱多加柴胡寒多加草果

五勞圓治勞瘵瘵久病

嫩黃常山

參兩
半

桃仁

去皮尖炒
壹兩貳錢

辣桂

去麁皮
柒錢半

淡豉

參
兩

烏梅肉

貳兩
半

右日乾為末煉蜜圓梧子大每參肆拾圓空心溫酒
下不飲者熱水入些酒下

經效瘡丹治瘡母結癖寒熱無已

真阿魏

雄黃

各貳錢半

朱砂

壹錢半

右沸湯泡阿魏研散雄朱為末和之稀麪糊圓桐子
大每壹圓人參煎湯候冷空心服瘡瘡桃枝煎湯冷
服臨發磨壹圓傅鼻頭口畔

消癖圓治瘡母停水結癖腹脇堅痛

芫花

炒

朱砂

研細等分

右為末煉蜜圓小豆許每拾圓濃煎棗湯下去癖須

用芫花大戟破水之劑下後即與養胃湯

驅瘡湯治諸瘡久瘡

草果仁

青皮

陳皮

人參

茯苓

半夏製

厚朴製

蒼朮炒

雞心檳榔

白朮

甘草炙各半兩

良薑壹分

右剉散每參錢薑伍片棗貳枚烏梅壹箇空心煎服
生熟飲治脾寒發瘡及寒多熱少

草果

肉豆蔻

各兩箇壹
煨壹生

川厚朴

方可許
二片

生薑

貳塊半生
半濕紙煨

甘草

貳寸半
生半炙

右剉散分貳服每服壹椀水貳棗壹烏梅煎半空心服

蒜丹圓截瘡消痰

草丹

煨

穿山甲

熱灰中炮
焦各壹分

土硫

兩半

右為末以獨頭蒜煨去皮研膏圓桐子大每拾圓生

薑烏梅紫蘇煎湯下

七物湯治諸瘡

常山

酒浸

檳榔

草果

青皮

陳皮

川厚朴

製

甘草

炒等分

右剉細每服參錢薑伍片烏梅貳箇水壹碗煎半露
壹宿來早溫服之如熱多加柴胡

截瘡丹臻志修合

土朱

貳兩半
淨末

真綠豆粉

貳兩壹兩生入
藥壹兩煮糊

信砒

有鋒芒者半
兩研細生

右用綠豆粉糊築和參件圓如麻子每服止貳圓新
汲水研桃軟空心服是日飲食微和而已

勝金圓治一切瘡寒熱不一嘔惡頭疼煩渴喘息痰聚
中滿

雞心檳榔

壹兩
日乾

川常山

酒浸蒸
焙肆兩

右為末水麪糊圓桐子大每服參拾圓於未發前半

日冷酒下便睡不得喫熱湯飲次日又用冷酒下貳拾圓仍不得喫熱飲食又次日飲食無拘

治瘡方二陳湯貳貼加常山貳錢分作兩服每服薑柒片棗貳枚烏梅貳枚水壹碗煎陸分候微冷吞前件脾積圓柒圓次日吞參圓

六物湯治久瘡不已寒少熱多

嫩常山

貳錢半

柴胡

雞心檳榔

青皮

去白各貳錢

草果仁

甘草

炙各壹錢半

右判分參服每服大軟烏梅貳箇好夏酒準壹啜許
新水貳盞煎半隔宿露空以紗蓋之次早拂明服若
寒熱等加製厚朴貳錢略煖服是日飲食皆勿用熱
附諸方

白虎加桂枝湯

活人方

治瘧疾但熱不寒及有汗者

知母

甘草

炙

桂枝

粳米

各參兩

石膏

壹斤

右咬咀每服伍錢水盞半煎至壹盞去滓溫服

大柴胡湯治瘧熱多寒少目痛多汗脉大以此湯微利

為度餘邪未盡以白芷石膏三物湯以盡其邪

方見傷食門

清脾飲

濟生方

治瘧瘧脉來弦數但熱不寒或熱多寒少

口苦咽熱小便赤澀

青皮

去白

厚朴

薑製

白朮

半夏

湯泡洗次

黃芩

草果仁

柴胡

去苗

茯苓

去皮

甘草

炙各等分

右咬咀每服肆錢水盞半薑伍片煎柒分溫服不拘

時

正氣散

徐同知方

退寒瘧止胃寒進食

藿香

草果

各肆兩

半夏

陳皮

厚朴

砂仁

甘草

各壹兩

右剉為散生薑棗子煎服如瘧未止俟發日早服

六和湯

人參

草果

知母

貝母

烏梅

白芷

檳榔

柴胡

各壹錢
用酒拌

常山

貳錢

石叟咀薑參片棗壹枚酒水同煎露壹宿臨發前貳時服

瘡疾治例

出明醫
雜著

王節齋曰瘡是風暑之邪有一日一發有二日一發有三日一發有間日連二日發有日與夜各發有有汗有無汗有上半日發有下半日發有發於夜者治

法邪從外入宜發散之然以扶持胃氣為本又須分別
陽分陰分而用藥邪癰及新發熱者可散可截虛癰
及久者宜補氣血若過服截藥致傷脾胃則必延綿不休
主方

柴胡

去苗

白朮

蒼朮

米泔浸各壹錢

已上三味癰疾必用之藥

陳皮

染分

甘草

炙伍分

乾葛

壹錢貳分

若一日一發及午前發者邪在陽分加枯黃芩伏苓

半夏

各壹錢

熱甚頭痛加川芎軟石膏

各壹錢

口渴加

石膏知母麥門冬

各壹錢

若間日或三日發午後或夜發者邪在陰分加川芎

當歸酒炒芍藥熟地黃酒炒知母

各壹錢

酒洗紅花

酒炒黃芪

各肆兩

提起陽分可截之

若間一日連發二日或日夜各發者氣血俱病加人

參黃芪白茯苓

各壹錢

以補氣川芎當歸白芍藥熟

地黃

各壹錢

以補血

若陽瘡多汗用黃芪人參白朮以斂之無汗柴胡蒼朮白朮黃芪乾薑以發之

若陰瘡多汗用當歸白芍藥熟地黃黃芪黃蘗以斂

之無汗柴胡蒼朮大川芎紅花升麻以發之故曰

有汗者要無汗正氣為主無汗者要有汗散邪為主

若病人胃氣弱飲食少或服截藥傷脾胃而少食者

加人參壹錢半酒炒芍藥大麥芽各壹錢

若傷食痞悶或有食積者加神麴麥芽枳實炒各貳錢

黃車

分伍

若痰盛加薑製半夏南星枳實

炒各壹錢

黃芩黃連

各陸分

若欲截之加檳榔黃芩青皮常山

各壹錢

烏梅淨肉

三箇

肥者

若日久虛瘡寒熱不多或無寒而但微熱者邪氣已無只用四君子合四物湯加柴胡黃芩陳皮以滋

補氣血

仁齋直指卷十二

欽定四庫全書

子部

仁齋直指卷十

四三

詳校官太醫院八品吏目_臣黃發

編修_臣倉聖脈覆勘

覆校官中書_臣朱

鈐

校對官主簿_臣汪日贊

謄錄監生_臣張炳

欽定四庫全書

仁齋直指卷十三

宋 楊士瀛 撰

明 朱崇正 附遺

霍亂吐瀉

吐瀉方論

乾上坤下其卦為否陽隔陰而不降陰無陽而不升此
否之所以痞而不通也人具此陰陽揮霍變亂結搏於
中卒然吐瀉或瀉而不吐或吐而不瀉大抵心腹擾悶

煩疼其視天地不交之否異乎否乎霍亂之證心腹卒
痛嘔吐下利發熱增寒頭痛眩暈先心痛則先吐先腹
痛則先瀉心腹俱痛則吐瀉俱作甚則轉筋頰頓特反
掌間蓋足陽明屬胃以養宗筋暴吐暴下津液驟亡宗
筋失其所養故攣急甚則舌卷縮囊危甚風燭矣然亦
何以致此哉曰胃傷暑毒露卧卑濕當風取涼風冷邪
氣入於腸胃加以嗜好肥腥飲啖生冷居處不節激而
發焉於是邪正相干中脘節閉氣不得通吐利暴作所

謂脾受賊邪木來勝土者此也治法霍香正氣散加霍
香生薑為上不惟可以溫散風邪抑亦可以調理吐瀉
其若傷暑所致未可遽投香薷散沉冷之劑自合先治
中脘如二陳湯橘皮半夏湯葷次則以香薷溫服散暑
解煩昧者指為脾胃虛冷遽用人參白朮芎子肉豆蔻
之屬以壯胃澀腸不思風冷未散驟以參朮芎蔻攔補
寒邪邪氣得之愈盛愈作縱得淹延或下痢或久瀉或
腹脹虛浮或中滿不食變證百出矣抑猶有說焉濕霍

亂死者少乾霍亂死者多許仁則嘗有是言矣蓋謂所傷之物因吐利而出泄泄盡則止猶可幸免若上不得吐下不得利所傷之物擁閉正氣闕隔陰陽燥擾喘脹其能生乎則知揮霍變亂如人被髮交爭必有以捄之可也古方用來復丹正取踈利之意但多則太溫莫若薑湯下蘇感圓為愈霍亂氣息劣不欲言者不治

又論

治嘔吐莫先於助胃既助胃而復嘔吐者中脘挾風寒

也治喘嗽莫先於調肺既調肺而復喘嗽者風寒在表或在裏也瀉痢之疾固腸斷下終不作效非腸胃間留蓄風寒邪氣之所致乎故必隨其感受解散於其先則某病某藥庶乎其對證矣解散風寒不換金正氣散為上其間增益則青皮官桂良薑乾薑擇用最良若欲其清解則紫蘇荊芥乾葛柴胡等輩劑量可也惟暑亦然每每隱伏作病或為熱嘔或為焦煩或為腹痛或泄痢不止暑中類多有之炎燠蘊隆念慮又當及此此說雖

詳於卷首敬用申之

吐瀉證治

霍香正氣散治霍亂吐瀉通用腹痛者加桂小便不利者加伏苓方見嘔吐門此藥能溫散風寒濕氣若暑證加香薷

五苓散治霍亂熱多發渴方見水飲門

良薑飲治霍亂神效

良薑

霍香

陳皮

各壹兩

甘草

炙參分

右剉細每參錢水煎服

又方

霍香葉

良薑

木瓜

右同煎治霍亂水瀉效

治要除濕湯

半夏麴

川厚朴

製

蒼朮

炒各貳兩

霍香葉

陳皮

茯苓

各壹兩

甘草

錢灸柒

右剉散每服肆錢薑柒片棗壹枚煎服霍亂瀉而不吐者加桂吐而不瀉者去蒼朮加桂丁香吐瀉俱作兼腹痛者只加桂

胡椒湯治霍亂吐瀉

胡椒

柒粒

生綠豆

貳拾壹粒

右末煎宣木瓜湯溫和調下

治中湯治飲食居處不節以致霍亂

方見嘔吐門

本方青皮

陳皮乾薑能散風冷

香薷剉散治傷暑霍亂

方見暑門

木瓜湯治吐瀉不已轉筋擾悶

酸木瓜

壹兩

茴香

壹分微炒

甘草

炙貳錢

吳茱萸

半兩盞柒次焙

右剉散每肆錢薑伍片紫蘇拾葉空心急煎服

四順附子湯治吐瀉過多手足逆冷六脉沉細氣小不

語急服

生附子

白薑

炮

人參

甘草

炒各壹分

右剉每服肆錢水貳盞煎壹盞空腹服腹痛加桂小

便不利加伏苓仍用炒鹽熨或用薑附湯

方見寒類

薑鹽飲治乾霍亂欲吐不吐欲瀉不瀉痰壅腹脹

鹽

壹兩

生薑

半兩切

右同炒令色變以童尿兩盞煎壹盞分為貳溫服

鹽湯法治乾霍亂心腹絞痛欲吐不吐欲下不下

先以鹽湯壹盞頓服候吐出令透不吐再服續以剉
理中湯倍加橘紅與之或霍香正氣散加官桂伏苓
倍加枳殼或蘇合香圓用枳殼散調下

蘇合香圓

方見諸氣門

用枳殼壹分木瓜半分煎湯調下治

乾霍亂不吐不瀉氣痞於中心腹絞痛此證最惡

鹽熨方治霍亂吐瀉心腹作痛

炒鹽貳碗紙包紗護頓其胃前并腹肚上截以熨斗
火熨氣透則蘇續又以炒鹽熨其背則十分無事

霍亂吐瀉臨時無藥以生蒜頭研細塗心下及兩脚心即止

附諸方

不換金正氣散治霍亂轉筋嘔吐泄瀉頭疼

方見瀉痢門

六和湯治心脾不調氣不升降霍亂吐瀉暑天瀉痢

方見暑門

理中湯治中寒霍亂吐瀉

方見寒門

七氣湯

三因方

治七氣鬱結五臟之間互相刑剋陰陽不

和揮霍變亂吐利交作

半夏

湯洗

厚朴

薑製

桂心

各卷

白芍藥

伏苓去皮各肆兩

紫蘇葉

橘皮

各貳兩

人參

去蘆壹兩

右咬咀每服四錢水一盞酒半盞生薑七片棗一枚煎七分溫服

加減理中湯

人參

白朮

乾薑

甘草

炙各等分

若為寒氣溫氣所干者加附子壹兩名附子理中湯

若霍亂吐瀉加陳皮青皮各壹兩名治中湯

若乾霍亂心腹作痛先以鹽湯少許頻服候吐出令透即進此藥

若嘔吐者於治中湯內加丁香半夏壹兩每服生薑拾片同煎

若泄瀉者加橘紅茯苓各壹兩名補中湯

若澹泄不已者於補中湯內加附子壹兩○不喜飲米穀不化者加縮砂仁壹兩共成八味

若霍亂吐下心腹作痛手足逆冷於本方內去白朮
加熟附名四順湯

若傷寒結胸先以桔梗枳殼等分煎服不愈者及諸
吐和後胃痞欲絕心膈高起急痛手不可近者加
枳實伏苓各壹兩名枳實理中湯

若渴者再於枳實理中湯內加括萎根壹兩

若霍亂後轉筋者理中湯內加火煨石膏壹兩

若臍上築者腎氣動也去朮加官桂壹兩半腎惡燥

故去術恐作奔豚故加官桂

若悸多加茯苓壹兩

若渴欲飲水者添加術半兩

若腹滿者去白術加附子壹兩

若飲酒過多及啖炙煖熟食發為鼻衄加川芎壹兩

若傷胃吐血以此藥能理中脘分利陰陽安定血

脉

泄瀉

泄瀉方論

胃為水穀之海其精英則流布以養臟腑其糟粕則傳送以歸大腸腸胃虛弱或挾風挾寒或傷暑傷濕停冷蓄熱冷熱不調泄瀉諸證皆能致之挾風者自汗惡風痛引腰背挾寒者筋節拘急身體怯寒傷暑者面垢燥渴泛引水漿傷濕者肌肉虛浮肢體重著冷則腸鳴肚冷而手足清熱則煩燥肚熱而手足溫冷熱不調者由熱積於內不能去其積徒以冷藥冰之熱氣無所發泄

故冷與熱搏而下注其或冷積於中不能去其滯徒以
熱藥壓之冷積不得宣行故熱與冷干而成泄或澁或
澹裏急後重是其候也外此則傷食一證失飢傷飽胃
不能消心腹膨脹所下酸臭可驗焉治法當究其感受
之源然後為之固實不窒其源吾恐決潰四出莫知其
終者矣雖然脾胃合氣以消水穀水穀既分安有所謂
泄人皆以泄為脾恙而不知腎病有泄焉腎泄何如曰
腹痛無定處似痢非痢骨弱面黧脚下時冷者是也前

件諸方條例于后至若泄利之後腹滿身疼是則為表裏俱病先當溫裏急與四逆湯然後解表急以桂枝湯與之活人書言之詳矣抑猶有緒餘之論焉肝者脾之賊木能勝土古人慮之固也經曰肝腎氣虛為病泄瀉亦孰知腎者所以守司於下而肝者又門戶要束之具束則不泄也不然泄瀉而面色青慘者古書謂肝經受寒所致特設當歸厚朴湯以主之果何意哉

下利惡證
具載活人

總括

泄瀉證治

理中湯治腸胃虛弱滲瀉有聲泄瀉頻併

人參

白朮

乾薑

炒

甘草

炒各壹兩

加茯苓

川厚朴

製各叁分

右剉細每服叁錢空心煎服

調中散治腸虛泄瀉止嘔進食

藿香葉

縮砂

蓬朮

炮

乾薑

炮

肉桂

茴香

炒

草果

各半兩

麥牙

炒

益智仁

橘紅

各叁分

蒼朮

炒

神麴

炒

甜梗

各壹兩

甘草

炙叁錢

右末每服叁錢薑棗并少鹽煎服

肉蔻散治脾虛腸鳴泄瀉不食

大肉豆蔻

壹枚剉小窠子入乳香三小塊在內以麴裹煨麴熟為度去麴

右末每壹錢水飲調下

治要除濕湯治風邪泄瀉加辣桂寒邪泄瀉加乾薑良

薑通用加木香

方見吐瀉門

香薷對散

方見暑門

治傷暑泄瀉更增伏苓

平胃散治傷濕泄瀉

橘紅

厚朴

製各參兩半

蒼朮

炒伍兩半

甘草

炙壹兩

右剉細每服參錢薑棗煎服

又法以生料五苓散對夾平胃散用陳米煎暑瀉濕瀉諸證皆驗

黃連阿膠圓治暑瀉熱瀉

方見嗽門

用五苓散送下

方見水飲門

又洞泄方車前子末米飲下

藥皮湯治協熱泄瀉亦治血痢

藥皮

參兩

黃芩

貳兩

黃連

壹兩

右剉每服肆錢水大盞煎柒分入阿膠末半錢再煎少頃溫服

薑附湯治冷證泄瀉

方見寒類

米附湯

見濕類

通用

大已寒圓治虛冷腸鳴滑泄

良薑

乾薑

炮各陸兩

肉桂

革撥

各肆兩

右末麴糊圓桐子大每伍拾圓米飲下

戊巳圓治冷熱不調泄瀉

吳茱萸

炒

黃連

去鬚

白芍藥

等分

右末米糊圓桐子大每叁拾圓空心米飲下

真人養臟湯治冷熱不調泄瀉裏急後重

罌粟殼

去筋萆蜜炙壹兩捌錢

木香

白芍藥

錢各捌

訶子肉

錢六

人參

白朮

當歸

錢各叁

甘草

炙

肉桂

錢各肆

右麤末每服貳錢薑棗煎食前服先用縮砂煎湯下

感應圓

方見脹滿門

俟其積消然後服此

雞舌香散治飧食生冷久為冷積

良薑

辣桂

香附

淨炒

益智仁

天台烏藥

各壹兩

甘草

炙半兩

右末每貳錢入少鹽沸湯點吞感應圓

三稜散酒食傷積用此

京三稜

炮

蓬莪朮

炮

益智仁

甘草

炙

青皮

去白各貳兩

白茯苓

肆兩

右末每貳錢少鹽煎吞感應圓治傷食泄瀉俟酸臭出盡即服固腸散止之

固腸散治冷瀉腸滑及下痢頻併

罌粟殼

去筋萆壹兩炙

陳米

炒壹兩

乾薑

炮

甘草

炙各貳錢半

肉豆蔻

生貳錢

木香

壹錢

右末每貳錢薑棗煎食前服

實腸散治泄瀉不止

川厚朴

製壹兩半

肉豆蔻

訶子

炮

縮砂

橘紅

蒼朮

炒

茯苓

各壹兩

木香

半兩

甘草

炒肆錢

右麤末每參錢薑棗煎服手足冷加炒乾薑

安腎圓

方見水
飲門

治腎泄腹痛無定處似痢非痢骨痛面

驚腰脚時冷用和劑七氣湯送下

方見
氣門

震靈丹治腎泄證候同前

禹餘糧

火煨醋淬不計遍
次手搥得碎為度

丁香代赭石

如
修製

赤石脂

紫石英

杆碎以上各肆兩入甘錫
內以瓦蓋口鹽泥固濟候

乾月硬炭壹拾斤煨通紅火盡為
度入地坑埋出火毒臧宿研末

的乳香

研別

沒藥

五靈脂

並去砂石
研各貳兩

朱砂

壹兩
研

右並為細末糯米粉糊圓小雞頭大風乾每服參圓
用炒故紙入棗煎湯調鐘乳粉少許空心送下小兒
腎泄白膿褐汁面黯齒脫猥人怯寒震靈丹末入此
鐘乳粉以棗煎炒故紙取熟汁調下

木香散治脾胃俱虛泄瀉

肉豆蔻

麩果
紙煨

故紙炒

白朮

白伏苓

各半
兩

木香

甘草

炙各
壹分

右剉細每參錢食前薑棗煎溫服

二神圓治脾腎俱虛泄瀉不食

破故紙

肆兩炒

肉豆蔻

貳兩生

右末用肥棗蒸爛取肉研膏夾和杵圓桐子大每服肆拾圓清米湯下若飯食後常一泄服此頓愈

當歸厚朴湯治肝經受寒面色青慘厥而泄利

當歸

炒

厚朴

製各貳兩

官桂

參兩

良薑

伍兩

右剉散每參錢食前服

附諸方

白朮芍藥湯

機要方

治太陰脾經受濕水泄注下體重微

滿困弱無力不欲飲食暴泄無數水穀不化

白朮

芍藥

各壹兩

甘草

伍錢

右咬咀每服壹兩水煎

升陽除濕湯

按粹方

治脾胃虛弱不思飲食腸鳴腹痛泄

瀉無度小便黃色四肢困弱

升麻

柴胡

防風

神麴

澤瀉

猪苓

各半兩

蒼朮

壹兩

陳皮

甘草

炙

大麥芽

各叁錢

右㕮咀水煎食後熱服

升陽除濕防風湯

東垣方

如大便閉塞或裏急後重數至

圓而不能便或有白膿或血慎勿利之利之則必致重病及鬱結而不通也又此道舉其陽則陰氣自降矣

蒼朮

米泔浸去皮乾淨肆兩

防風

貳錢

白朮

白茯苓

白芍藥

各壹錢

右咬咀除蒼朮另作片子水壹碗半煎至貳盞內諸藥同煎至壹大盞食前熱服

益胃湯

拔粹方

治頭悶勞動則微痛不喜飲食四肢怠惰

燥熱短氣口不知味腸鳴大便微澹黃色身體皆悶口乾不喜飲冷

黃芪

甘草

半夏

湯泡各貳分

黃芩

柴胡

人參

白朮

益智

各三分

當歸梢

升麻

各半錢

陳皮

半錢

蒼朮

壹錢半

右咬咀水盞半煎捌分食前通口服

胃苓湯治感暑夾食泄瀉煩渴平胃散五苓散相合

蒼朮

陳皮

厚朴

薑製

甘草

白朮

伏苓

豬苓

澤瀉

桂

右咬咀水煎入鹽少許服如作末藥湯服亦可

柴苓湯分理陰陽治瀉解熱

柴胡

黃芩

半夏

甘草

減半

人參

豬苓

白朮

茯苓

澤瀉

各等分

水貳鍾薑參片煎服

養胃湯治脾胃虛寒嘔逆惡心腹脇脹痛腸鳴泄瀉

方見

痰瘕
門

五苓散益元散

並見暑門

丹溪方治一老人奉養太過飲食傷脾常常泄瀉亦是脾泄

黃芩

炒半兩

白朮

炒貳兩

白芍藥

酒拌炒

半夏

泡各半兩

神麴

炒

山楂

炒各壹兩半

藿香

壹兩

右為末青荷葉包飯燒熟研丸如梧子大食前白湯下

錢氏白朮散治氣血俱虛神弱之人或吐瀉

人參

白伏苓

白朮

木香

甘草

霍香

各壹兩

乾薑

半兩

右為粗末每服伍錢水壹鍾煎柒分食前溫服

參苓白朮散治脾胃氣虛飲食不進或致吐瀉

方見虛勞門

溫臍止瀉散治大人小兒久瀉滑脫不止

乾薑

微炒

白芷

附子

生各壹錢

右為細末用生白蜜丸如彈子大按入內一二日即

止

泄瀉治例

出明醫雜著

王節齋曰泄本屬濕然多因飲食不節致傷脾胃而作須看時令分寒熱新久而施治治法補脾消食燥濕利小便亦有升提下陷之氣用風藥以勝濕亦有久泄腸胃虛滑不禁者宜收澀之

主方

白朮

錢貳

白茯苓

白芍藥

炒各壹錢半

以上三味泄瀉必用之藥

陳皮

壹錢

炙甘草

去皮
伍分

若傷食泄黃或食積加神麴大麥芽山查子

各壹炒錢

黃連

柒分

消之腹中窄狹飽悶再加厚朴枳實木香

各伍分

若小便赤澁短少加澤瀉猪苓木通

各壹錢

以分利之

夏月再加茵陳

柒分

炒山梔仁

肆分

若口渴引飲加乾葛

壹錢半

人參麥門冬

各壹錢

升麻滑

石

各肆分

烏梅肉

貳箇

若夏秋之間濕熱大行暴注水泄加炒黃連蒼朮澤

瀉

各壹錢

升麻木通

各伍分

發熱燥渴加乾葛石膏

各壹錢

錢

黃疸小便黃赤加茵陳

壹錢

山梔木通

各伍分

若飲酒便泄此酒積熱瀉也加炒黃連茵陳乾葛

各壹錢

錢

木香

伍分

神麴麥芽

各捌分

若寒月溏泄清冷腹痛或傷生冷飲食加神麴麥芽

炙乾薑

各壹錢

砂仁益智木香

各柒分

若久泄胃氣下陷服利小便之藥而不效宜加人參

黃芪

錢各壹

以補中氣升麻柴胡

各肆分

以升提之加

羌活防風藁本白芷等風藥

各叁肆分

助風以平之更

加炙乾薑

伍分以固之

若久泄脾胃虛弱食少難化加炙黃芪人參

各壹錢

神

麴麥芽

各壹錢貳分

木香

煨過

乾薑

各伍分

若久瀉腸胃虛滑不禁加肉豆蔻

壹錢

訶子皮赤石脂

各壹錢

煨木香炙乾薑

各伍分

針灸法脾腧二穴

在十一椎下兩傍各開寸半主泄瀉

中脘一穴

在臍上四寸主

腹痛關元一穴

在臍下三寸療腹泄不止

天樞二穴

在臍傍各開三寸治腹滿脾洩

瀉大腸俞二穴

在十六椎下各開寸半灸三壯治腸鳴腹脹暴瀉

仁齋直指卷十三

欽定四庫全書

仁齋直指卷十四

宋 楊士瀛 撰

明 朱崇正 附遺

瀉痢

瀉痢方論

痢與瀉名目不同而感受之源一也風邪得之鼻壅惡
風腰背強痛寒邪得之面慘惡寒肢體拘攣受暑得之
面垢背寒自汗發渴受溫得之一身盡痛重着浮黃或

停冷則淒清腸鳴或蘊熱則發熱煩燥冷熱不調者乍
澁乍瀉飲食傷飽者注下酸臭諸有積以肚熱纏痛推
之諸有氣以狀如蟹渤驗之究其受病之源決之對病
之劑大要以散風邪行滯氣開胃脘為先不可遽用肉
豆蔻芎子白朮輩以補住寒邪不可遽投罌粟殼龍骨
牡蠣輩以閉澁腸胃邪氣得補而愈盛補之愈盛而愈
作不為纏擾撮痛則為裏急後重所以日夕淹延而未
已也痢之赤白其赤者熱乘於血血滲大腸則赤也若

風邪挾熱則所下黃而赤焉其白者冷搏腸間津液凝滯則白也若寒邪併之則所下白而黑焉冷熱相交故赤白相半重者狀若膿涕而血雜之輕者白涕中間微有赤縷是也內挾風邪故清血流注或濕毒乘虛入腸胃之間則下如豆汁或有瘀血是也論者以手足寒為冷手足溫為熱於理甚當亦當合赤白而並觀之庶乎其的矣雖然風寒暑濕感之於外者也其有大嚼傷飽宿酒漿醢醢以成積滯房閨縱情加奔走勞役以耗精

血此非病生於內者乎必明白內外而權度之則受病淺深用藥輕重知有定嚮矣母槩曰無積不成痢○下痢壯熱須用敗毒散加陳米間與五苓散黃連阿膠丸○下痢雖曰有積有暑如用藥不效即是腸胃有風邪熱者赤者與敗毒散冷者白者不換金正氣散加木香瀉痢證治

敗毒散治風邪寒邪壯熱下痢

方見寒類

陳米飲調五苓散

佐之

方見水飲門

不換金正氣散治風邪寒邪冷證下痢

方見寒類

治要除濕湯

方見吐瀉門

加官桂木香治風寒冷證下痢加

乾薑伏苓治傷濕下痢仍以五苓散利其小便

理中湯

方見瀉門

加厚朴木香伏苓治濕冷下痢

艾薑丸治濕冷下痢膿血腹痛婦人下血

乾艾葉

肆兩炒焦存性

川白薑

壹分炮

石為末醋煮麪糊丸桐子大每染拾丸食前清米飲

下

人參豆蔻散冷證瀉痢通用

木香

厚朴

製

蒼朮

米泔浸曬

乾薑

炮

肉豆蔻

生各貳兩

半夏麴

陳皮

阿膠

炒各肆兩

縮砂

甘草

炒各貳兩半

罌粟殼

去筋萆醋淹炒肆兩

右剉每參錢薑棗煎食前服

香薷剉散五物香薷湯六和湯

方見暑門

治傷暑下痢五苓

散佐之

升麻湯

升麻

白芍藥

甘草

炙各
拾兩

白乾葛

拾伍
兩

右麤末每參錢薑參片同煎吞感應丸治傷暑下痢

纏痛

黃連阿膠丸

方見
嗽門

藥皮湯

方見
瀉門

治熱證發熱下痢亦治

暑痢

香連丸治冷熱不調瀉痢

黃連

壹兩用茱萸半兩炒去茱萸不用

木香

壹分

右取香連為末醋糊丸桐子大每參拾丸米飲下前

戊己丸通用

真人養臟湯治冷熱不調下痢

方見瀉門

依前法用之

三稜散治食積下痢腹痛

方見瀉門

依前法用之

感應丸

方見諸氣門

解毒雄黃丸

方見諸熱門

治諸積下痢用五

苓散送下

和劑流氣飲大異香散五膈寬中散

方見諸氣門

治諸氣痢

牛乳湯治氣痢泄如蟹渤

葷撥末

錢貳

牛乳

半升

右同煎減半空腹服

茱連丸治赤白下痢

吳茱萸

揀淨

黃連

去鬚半寸一截同炒熟分為二處

右各碾末醋麪糊丸桐子大赤痢專服黃連白痢專服茱萸赤白併服或多或少以意增減每服茱拾丸陳米飲下以愈為度

胃風湯治風冷客入腸胃泄下鮮血及腸胃濕毒下如
豆汁或下瘀血

人參

白伏苓

川芎

當歸

辣桂

白朮

白芍藥

等分

石劉每服參錢粟米百餘粒同煎食前熱服腹痛加
木香

肉蔻散治冷證久痢不止

方見
瀉門

附子理中湯薑附湯

方見寒類

術附湯

方見濕類

治虛損久痢四

肢厥冷以意擇用

禁口痢方

石蓮肉

乾日

右為末每服貳錢陳米飲調下便覺思食仍以日照東方壁土炒真橘皮為末薑棗略煎佐之

斷下湯止赤白痢

伏苓

白朮

各壹錢

甘草

半錢

草果

連皮壹枝

大罌粟殼

拾肆枝去筋萼剪碎醋浸炒燥

加木香

半錢

石為麤末分作兩服每服薑伍片大棗叁箇大烏梅

叁箇食前煎服固腸散

方見瀉門

通用

玉華白丹治臟腑久虛止瀉止痢

陽起石

入乾鍋煨通紅酒淬頻陰地令乾莫見日

白石脂

煨紅

左顧牡蠣

鹽泥周濟煨紅取白者各半兩

鍾乳粉

壹兩

石研極細如粉和畢糯米糊圓空心米飲下渴者人

參湯下亦治腸風下血又震靈丹

方見通用
瀉門

赤石脂禹餘糧湯治瀉痢諸藥不效以此固其下焦

赤石脂

劉小塊

禹餘糧

煨醋淬以
碎為度

右等分夾和每服肆錢空心煎溫服

瀉痢須要衣服周密恐傷風冷凡蘊熱血痢裏急而痛甚雖已踈通蕩滌然其痛不減者非熱亦非積也榮血虧少陽剛勝陰故爾用藥當以川芎為佐榮血一調其痛立止

附諸方

防風芍藥湯

按粹方

治泄痢飧泄身熱脉弦腹痛而渴及

頭痛微汗

防風

芍藥

黃芩

各壹兩

右㕮咀每服壹兩水貳鍾煎至壹鍾去滓食前通口服

經驗栢皮湯治傷寒下痢亦治久血熱痢

藥皮

叁兩

黃芩

貳兩

黃連

壹兩

右吹咀每服壹兩水貳鍾煎至壹鍾去滓通口服腹痛加山梔子小便不利加赤茯苓阿膠煎服

芍藥藥皮湯

方子和

治一切溫熱惡心痢頻併窘痛無問

膿血

芍藥

黃蘗

各壹兩

當歸

黃連

各半兩

石為末水丸豆大溫水下參肆拾丸等服忌油膩生

冷熱物

黃連香薷飲治感暑下痢鮮血

清暑益氣湯治暑病內傷下痢不思飲食發熱

並見暑門

白朮芍藥湯

機要方

治老人奉養太過飲食傷脾時或瀉

痢

錢氏白朮散治氣血俱虛之人或瀉或痢

並見泄瀉門

蒼朮芍藥湯

粹粹方

治痢疾痛甚者

蒼朮

貳兩

芍藥

壹兩

黃芩

官桂

錢各伍

右㕮咀每壹兩水貳鍾煎至壹鍾溫服

芍藥黃芩湯

按粹方

治泄痢腹痛或後重身熱久不愈脉

洪疾者及下痢膿血稠粘

黃芩

芍藥

各壹兩

甘草

炙半兩

右㕮咀每服壹兩水貳鍾煎至壹鍾去滓通口服食
前

調胃承氣湯小承氣湯大承氣湯

俱見傷寒門

四物湯

保命集

治下痢純血

川芎

當歸

酒洗

白芍藥

生地黃

槐花

黃連

御米殼

等分

右咬咀水煎服

地榆芍藥湯

按粹方

治泄痢膿血乃至脫肛

蒼朮

剉兩

地榆

貳兩

卷栢

芍藥

各叁兩

右咬咀每服壹兩水貳鍾煎至壹鍾食前通口服

阿膠梅連丸

宣明方

治下痢無間久新赤白青黑疼痛諸

証

金井阿膠

淨草灰炒透
明白別研細

赤伏苓

烏梅肉

去核炒

赤芍藥

黃栢

剉炒

黃連

去鬚

乾薑

炮

當歸

酒洗各
等分

石為細末入阿膠研勻水丸梧子大溫米飲下拾丸
食前連夜伍陸服小兒丸如菰豆大忌油膩脂肥諸
物

石榴皮散

經驗方

治暴瀉不止及痢赤白

用酸石榴皮燒存性不以多少空心米飲調下貳錢

保和丸專治脾虛因積作後重者不可下用此消導

方見

積聚

門

秘傳香連丸治男婦小兒諸般痢疾作痛並久痢虛脫
濃血不止者服之神效如初痢一二日之間不可服恐
攔住積滯熱毒他証愈劇反為咎矣

川黃連

酒潤炒
伍兩

木香

白豆蔻

各壹
兩半

乳香

沒藥

各伍錢

右為細末麪糊丸如彈子大每服壹丸赤者甘草湯
搗下白者生薑湯下

黃連湯治痢疾

黃連

滑石

生地黄

白芍藥

蒼朮

白朮

當歸

青皮

條黃芩

各等分

右㕮咀每服柒錢水貳盞煎捌分去滓食遠溫服

大柴胡湯治下痢舌黃口燥胃滿作渴身熱腹脹譫語
此必有燥屎宜下後服木香黃連苦堅之三乙承氣湯
暑毒溫熱傷後下痢膿血宜服二方見傷寒門
針灸法見前泄瀉門詳施

脫肛

脫肛方論

四十八難曰病之虛實出者為虛入者為實肛門之脫
非虛無故然哉蓋惟實則溫溫則內氣充而有所蓄惟

虛則寒寒則內氣餒而不能收而況大腸之厚薄膏脂之瘠肥亦視夫內氣之虛實何如耳大凡脫肛須以溫湯澆令和軟然後摩挲而入治法以溫斂行之其有產婦用力過多及小兒叫號努氣久痢不止風邪襲虛亦有此證○凡腸頭作癢即是腹中有蟲生艾苦練根煎湯熏洗仍以乾艾生薑煎服其脫肛腸風痔漏者登溷不可用舊紙若包裹湯藥雜物尤不可用纔有一毫染汚其間立見痛腫如此急以溫湯滌之患在肛腸登溷

後須用一洗

脫肛證治

蝟皮散治肛門脫出不收

蝟皮

壹箇火內燒
令焦黃存性

磁石

半兩法醋煎數沸
焦磁石柒次為末

辣桂

錢參

鱉頭

壹枚慢火
炙令焦黃

右細末每服貳錢食前米飲調下仍以破草鞋底炙
上面熨按令入

鱉頭散治脫肛

驚頭

沒火炙
焦黃

右為末塗腸頭用軟紙襯輕輕按入仍以方寸匕
食前米飲調下

磁石散治脫肛

磁石

半兩焦入煎沸
醋中凡柒次

右為末每服壹錢空心米飲調下

香荊散治脫肛

大香附

荊芥穗

各半
兩

縮砂

貳錢
半

右末每服參錢食前新水煎數沸即服小兒通用

釣腸丸治大腸空冷脫肛不收及腸風諸痔

白礬

枯

綠礬

枯

訶子

煨取肉

枳殼

去穰
炒

白附子

生南星

生半夏

生附子

去皮臍已
上各壹兩

黃瓜蔓

壹箇
燒存性

蛻皮

壹箇剉碎
燒存性

雞冠花

剉炒
兩半

胡桃仁

非箇不用油者
錐內燒存性

右細末醋煮麴糊丸桐子大每服貳拾丸空心溫酒

下或枳殼散送下

縮砂湯治大腸虛而決熱脫肛紅腫

縮砂

黃連

木賊

右末每貳錢米飲調下

黃連阿膠丸

方見嗽門

治腸虛為暑熱所攻脫肛紅腫肛門

熱痛仍以荊芥穗朴硝泡湯溫洗次用薄荷煎鵬砂丸

津液調傳

鐵粉散治大腸本虛風毒客熱乘之脫肛紅腫

鐵粉

細研

右入白斂末夾和傅之即按入

蒲黃膏治脫肛熱痛

生蒲黃以豬膏和傅即按入

桑螺膏治脫肛

桑楔上緣桑螺子

燒存性

右末以豬膏和塗雨後緣桑者佳

橡斗膏治脫肛

橡斗子燒存性猪脂和傅

木賊散治脫肛不熱

木賊燒存性為末糝以帛按入

獨虎散治脫肛不收五倍子半兩末井水參碗入磁瓶
慢火煎半續入朴硝荊芥穗各壹錢乘熱熏洗仍以五
倍子末傅之

石灰方治大腸積冷久年脫肛

石灰炒熟以帛包裹肛坐其上冷又別換仍以海

螻蛄末傳

敗毒散小兒痢後風邪入大腸脫肛不收以此散風邪

加陳米煎

方見寒類

桑葉方

黃皮桑椹取葉參升煎帶溫

右以布盛罨小兒肛門輕手按入次用門臼中細塵
綿包撲之

小兒灸法百會穴直取前後髮際折中橫取兩耳尖折

中在順之中心端正螺毛處是也兩手握蒜灸灸則肛
腸自收

濕蠶證蟲蝕肛門咽乾唇瘡齒晦

方見活人總括

附諸方

二靈散治久痢腸胃俱虛肛門自下

龍骨

煨伍錢

木賊

燒存性貳錢伍分

右為末摻托之

一方治脫肛用五倍子為末每用參錢入白礬壹塊水

貳碗煎洗

一方用蔓陀羅花子連殼壹對椽斗拾陸箇搗碎水煎
參伍沸入朴硝熱洗其肛自收

一方用浮萍為末乾貼患處

針灸法命門一穴

在十四椎下灸二七壯
治大腸虛冷脫肛不收

長強一穴

在尾

閭骨尖底灸二七壯治
痢腸風痔漏脫肛不收

仁齋直指卷十四